


# Impfplan Österreich 2020



## Legende

- **Impfung empfohlen**  
kostenfrei
- **Nachhol-Impfung empfohlen**  
kostenfrei
- **Impfung empfohlen**  
nicht kostenfrei
- **Nachhol-Impfung empfohlen**  
nicht kostenfrei
- **Nachhol-Impfung empfohlen**  
zum vergünstigten Selbstkostenpreis

- 1 1. Dosis
- 2 2. Dosis
- 3 3. Dosis
- 4 4. Dosis
- B Boosterimpfung
- 13 13-valente Pneumokokkenimpfung
- 23 23-valente Pneumokokkenimpfung

**Hinweis:**  
Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht. Details siehe Impfplan Österreich 2020 (verfügbar unter [www.sozialministerium.at/impfplan](http://www.sozialministerium.at/impfplan)) bzw. entspr. Fachinformation.

Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfungen bei Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden.

- a** Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (Rotateq, 3 Dosen)
- b** Wenn nicht zuvor erfolgt, Impfung gegen Pertussis spätestens bei Schulaustritt
- c** Nach Grundimmunisierung und mindestens zwei Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter weitere Impfungen nur bei Indikation.
- d** Kinder mit Risiken bis zum vollendeten 5. Lebensjahr kostenfrei

- e** Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen
- f** Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff
- g** Ab vollendetem 15. Lebensjahr 3 Dosen
- h** Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 9. Lebensjahr (off label) oder wenn das Kind bisher erst eine einzige Impfung erhalten hat, 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen; danach 1 jährliche Impfung ausreichend